

普及適用性試験成績 記入例(果樹・桑園・茶園 除草剤)

果樹・桑園・茶園 除草剤用

* 非対象雑草は()でくり総計から除く。 ** 総合評点の欄 A: 除草効果・薬害の面で普及上特に問題はない
 B: 普及にあたって更に検討する必要がある
 -: その他(特別な理由により判定できない場合)

薬剤名: _____ 対象作物: _____

県名	実施場所	区別	品樹種 樹齢	土質性 土質	栽培法	処 理			処理時の雑草発生状況 主要雑草名・生育程度(草丈)	殺 草 経 過	残草量 (草種別 g/m ²)						作物への影響	総合評点	備 考 (特記事項)
						薬剤名	処理時期	薬量 (水量)			イネ科 一年生	非イネ科 一年生	イネ科 多年生	非イネ科 多年生	総 計	抑草期間			
○ ○ 県	△ △ △	実 験 慣 行	▽▽▽ 20年生	火山灰土 砂壤土	露地	○○○ 液剤	△月◇日	500ml (100L) /10a	メヒシバ 20cm ヨモギ 30cm シロザ 25cm スベリヒユ 15cm ギシギシ 30cm	効果の発現、 効果の完成と 完成時の状 態、再生、後 発生の有無等 を記入してく ださい。	0	シロザ 5g スベリヒユ 10g	-	ギシギシ 22g ヨモギ 34g	生草重 71 g (93%)	60日	なし	A 除草効果等につ いてコメントして ください。 降雨等試験条件 で特記事項が あれば記入して ください。 雑草調査日： □月△日 (処理○日後)	
						□□□ 乳剤	△月◇日	500ml (100L) /10a	メヒシバ 20cm ヨモギ 30cm シロザ 25cm スベリヒユ 15cm ギシギシ 30cm		メヒシバ 2g	スベリヒユ 18g	-	ギシギシ 10g ヨモギ 46g	生草重 76 g (100%)	60日	なし		